



A-4844 Regau
Handelsstraße 9
Tel. (0043)07672/716-0
Fax. (0043)7672/716-34
Tel. aus BRD: 01801/716000
Fax aus BRD: 01801/716001

Walnussfruchtfliege Komplett Set

Bestellnummer: 110516

info@faie.at, www.faie.at .de .eu .ch

FN 99302 h, Handelsgericht Wels, DVR-Nr. 0050741,
UID-Nr.: ATU 24781403, ARA Lizenznummer: 5720

10.05.201

Bedienungsanleitung

Natürlicher Pflanzenschutz für Haus & Garten

Pheromonfallen eignen sich hervorragend um Schadschmetterlinge, Schadfliegen und Schadkäfer in Ihren Kulturen zu vermindern.

Inhalt: 1 Fallenset besteht aus:

- 2 Fallenkörper (WitaTrap® Ballonfalle gelb)
- 2 Pheromonen (Lockstoffen) (Separat verpackt!),
- Aufhängung zur Montage und
- eine genaue Beschreibung.

Biologie des Schädlings - Walnussfruchtfliege

Schädling: **Walnussfruchtfliege**

Lateinischer Name: *Rhagoletis completa*

Vorkommen: **Walnussgewächse, Walnuss (*Juglans* spp.), Schwarznuss (*Juglans nigra*)**

Die Walnussfruchtfliege (*Rhagoletis completa*), ist ein Neozoon und als Gewinner des Klimawandels ein ernstzunehmender Schädling, vorwiegend an der Walnuss aber auch an Schwarznuss.

Hauptsymptome: Durch die Fraßtätigkeit der Larven kann nicht nur die Nussschale schwarz und unansehnlich, sondern auch der Nusskern selbst beeinträchtigt werden. Baum und Blätter werden nicht geschädigt. Es gibt Sortenunterschiede in der Anfälligkeit gegenüber dem Schädling. Frühreifende Sorten sind für den Befall der Walnussfruchtfliege attraktiver, spät reifende gelten allgemein als weniger anfällig.

Biologie: Wie die Kirschfruchtfliege hat auch die Walnussfruchtfliege nur eine Generation pro Jahr, wobei die Puppen im Boden überwintern (Diapause).

Eiablage: Ende Juli, 12–15 Eier werden unter die Haut der Fruchtschalen gelegt

Entwicklungsdauer: 5 Tage

Hauptflugzeit: Anfang Juli bis Ende September

Optimale Bedingungen: warme lange Sommer

Anwendung:

Um den Schädling nicht direkt in die zu schützenden Kulturen zu locken, sollte die Falle z.B. in einen anderen in der Nähe befindlichen Baum gehängt werden. Sollte dies nicht möglich sein, so kann die Falle auf einem eingeschlagenen Pflock befestigt werden. Die Falle in Augenhöhe zwischen Hauptwindrichtung und Baum aufhängen. Die Fallen dürfen nicht durch Zweige und Blätter versperrt sein. Jede Falle sollte in regelmäßigen Abständen von 2-3 Tagen kontrolliert werden. Bei starkem Fang die Leimflächen nachbeleimen bzw. die Falle erneuern. Der Lockstoff bleibt ca. 6-8 Wochen aktiv und sollte danach ausgetauscht werden. **Die Fallen sind vor dem Beginn des Fluges aufzuhängen.**

Verwendung Lockstoffbeutel Completawit: Die über den sichtbaren Löchern des Lockstoffbeutels befindliche Folie muss, zur Aktivierung des Lockstoffbeutels, abgezogen werden. Der restliche Beutel darf nicht beschädigt werden und wird über die runde Stanzung auf der Oberseite in die Lockstofffalle gehängt.